病名：　乳癌　　レジメン名：TC療法

1コース期間（休薬期間含む）　21　　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day21																			
			未適用	休薬																			
注射																							
グラニセトロン注 3mg100mL	1 V																						
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																						
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用																				
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●ドセタキセル注 ☆20mg	75 mg/㎡	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:10		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●エンドキサン注★ 600mg	600 mg/㎡	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:25		未適用																				
処方																							