

病名:子宮頸癌

レジメン名:CCRT(TC)

1コース期間(休薬期間含む) 35 日

| 薬剤名/ルート・用法          | 基準投与量                | 割合  | 1/1              | 1/2 | 1/3 | 1/4                  | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8              | 1/9 | 1/10 | 1/11                  | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15              | 1/16 | 1/17 | 1/18                   | 1/19 | 1/20 | 1/21 |  |
|---------------------|----------------------|-----|------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|------|------|------|--|
|                     |                      |     | 火<br>day1<br>未適用 | 水   | 木   | 金<br>day2~day7<br>休薬 | 土   | 日   | 月   | 火<br>day8<br>未適用 | 水   | 木    | 金<br>day9~day14<br>休薬 | 土    | 日    | 月    | 火<br>day15<br>未適用 | 水    | 木    | 金<br>day16~day21<br>休薬 | 土    | 日    | 月    |  |
| 注射                  |                      |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| グラニセトロン注 3mg 100mL  | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| アロカリス点滴静注235mg 10mL | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| デキサート注射液6.5mg 2mL   | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| ポラミン注 5mg 1mL       | 2 A                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| フアモチジン注射液 20mg      | 1 A                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:20                |     | 未適用              |     |     |                      |     |     |     | 未適用              |     |      |                       |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |      |      |      |  |
| ブドウ糖注 5% 250mL      | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| ●パクリタキセル注30mg       | 35 mg/m <sup>2</sup> | 100 |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管)     | 00:25                |     | 未適用              |     |     |                      |     |     |     | 未適用              |     |      |                       |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |      |      |      |  |
| 生理食塩液[化力]50mL       | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:30                |     | 未適用              |     |     |                      |     |     |     | 未適用              |     |      |                       |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |      |      |      |  |
| ブドウ糖注 5% 250mL      | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| ●カシボラン注 50mg 5mL    | 2 mg/GFR+25          | 100 |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管)     | 00:35                |     | 未適用              |     |     |                      |     |     |     | 未適用              |     |      |                       |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |      |      |      |  |
| 生理食塩液[化力]50mL       | 1 V                  |     |                  |     |     |                      |     |     |     |                  |     |      |                       |      |      |      |                   |      |      |                        |      |      |      |  |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:40                |     | 未適用              |     |     |                      |     |     |     | 未適用              |     |      |                       |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |      |      |      |  |

| 薬剤名/ルート・用法          | 基準投与量                | 割合  | 1/22              | 1/23 | 1/24 | 1/25                   | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29              | 1/30 | 1/31 | 2/1                    | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
|---------------------|----------------------|-----|-------------------|------|------|------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|
|                     |                      |     | 火<br>day22<br>未適用 | 水    | 木    | 金<br>day23~day28<br>休薬 | 土    | 日    | 月    | 火<br>day29<br>未適用 | 水    | 木    | 金<br>day30~day35<br>休薬 | 土   | 日   | 月   |
| 注射                  |                      |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| グラニセトロン注 3mg 100mL  | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| アロカリス点滴静注235mg 10mL | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| デキサート注射液6.5mg 2mL   | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| ポラミン注 5mg 1mL       | 2 A                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| フアモチジン注射液 20mg      | 1 A                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:20                |     | 未適用               |      |      |                        |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |     |     |     |
| ブドウ糖注 5% 250mL      | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| ●パクリタキセル注30mg       | 35 mg/m <sup>2</sup> | 100 |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管)     | 00:25                |     | 未適用               |      |      |                        |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |     |     |     |
| 生理食塩液[化力]50mL       | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:30                |     | 未適用               |      |      |                        |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |     |     |     |
| ブドウ糖注 5% 250mL      | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| ●カシボラン注 50mg 5mL    | 2 mg/GFR+25          | 100 |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管)     | 00:35                |     | 未適用               |      |      |                        |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |     |     |     |
| 生理食塩液[化力]50mL       | 1 V                  |     |                   |      |      |                        |      |      |      |                   |      |      |                        |     |     |     |
| 末梢点滴ケモ(持続)          | 00:40                |     | 未適用               |      |      |                        |      |      |      | 未適用               |      |      |                        |     |     |     |