病名：　頭頸部癌　　レジメン名：キイトルーダ療法（400mg/6週毎）

1コース期間（休薬期間含む）　42　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
			day1																					day2～day42			
			未適用																					休薬			
注射																											
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																										
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用																								
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																										
●キイトルーダ点滴静注★100mg4mL	400 mg/BODY	100																									
末梢点滴ケモ（持続）	00:10		未適用																								
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																										
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用																								
処方																											

1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月