

病名:悪性黒色腫

レジメン名:ニボルマブ+イピリムマブ療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
注射			day1 未適用	day2~day21 休薬																			
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●オプゾー点滴静注240mg24mL	80 mg/BODY	100																					
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●「必」ヤーボ点滴静注50mg10mL	3 mg/kg	100																					
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用																				
処方																							

注意コメント