

病名: 胃癌

レジメン名: トラスツズマブデルクステカン

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

| 薬剤名/ルート・用法              | 基準投与量     | 割合  | 1/1  | 1/2        | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
|-------------------------|-----------|-----|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         |           |     | 火    | 水          | 木   | 金   | 土   | 日   | 月   | 火   | 水   | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    |
|                         |           |     | day1 | day2~day21 |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 注射                      |           |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| パロチロン点滴静注パック 0.75mg 50m | 1 袋       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| デキサート注射液6.6mg 2mL       | 1 V       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 末梢点滴ケモ(持続)              | 00:05     |     | 未適用  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブドウ糖液 5%100mL「ヒカリ」      | 1 V       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 末梢点滴ケモ(持続)              | 00:10     |     | 未適用  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブドウ糖液 5%100mL「ヒカリ」      | 1 V       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ●インハート点滴静注用 100mg       | 6.4 mg/kg | 100 |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 注射用水 20mL               | 2 A       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管)         | 00:15     |     | 未適用  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブドウ糖液 5% 50mL「ヒカリ」      | 1 V       |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 末梢点滴ケモ(持続)              | 00:20     |     | 未適用  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 処方                      |           |     |      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

注意コメント