

病名: 胃癌

レジメン名: mFOLFOX6

1コース期間(休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			day1	day2~day14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			未適用	休薬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
注射																	デキサト注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																デキサト注 ★3.3mg 1mL	1 A																ハロヘトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg													
デキサト注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																デキサト注 ★3.3mg 1mL	1 A																ハロヘトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																														
デキサト注 ★3.3mg 1mL	1 A																ハロヘトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																															
ハロヘトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																	
中心静脈注射★	00:10		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																		
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																			
●オキサリプラチン注 ☆80mg	85 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																				
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																					
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																						
●レボリネート注 ☆ 25mg	200 mg/m ²	100															中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																							
中心静脈注射★	00:20		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																								
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																									
●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																										
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用														生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																											
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																												
中心静脈注射★	00:30		未適用														生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																													
生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
中心静脈ケモ CSTD(インフューザー・ポンプ)使用	00:35		未適用														処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
処方																	注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
注意コメント			day2-4デキサトロン8mg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			