

病名: 大腸癌

レジメン名: SOX+アービタックス(初回)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7							
			火	水	木	金	土	日	月							
			day1	day2~day7												
注射			未適用	休薬												
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A															
ポラミン注 5mg 1mL	1 A															
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg 50ml	1 袋															
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルパック)	0.8 V															
●アービタックス注 100mg 20mL	400 mg/m <sup>2</sup>	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用													
ブドウ糖注 5%★500mL	1 V															
●オキサリプラチン注 ☆50mg	130 mg/m <sup>2</sup>	100														
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A															
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:20		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用													
注意コメント	day1(夕)-15(朝) TS-1 80mg-120mg/day 朝・夕 day2-4デキサート8mg															
薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day8	day9~day14						day15	day16~day21					
			未適用	休薬						未適用	休薬					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V															
ポラミン注 5mg 1mL	1 A															
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用							未適用						
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋															
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m <sup>2</sup>	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用							未適用						