

病名: 大腸癌

レジメン名: IRIS+アバスチン(3週毎)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

| 薬剤名/ルート・用法 | 基準投与量 | 割合 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
|---------------------------|---|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 火 day1 未適用 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 注射 | | | day2~day21 | | | | | | | | | | | | 休薬 | | | | | | | | |
| パロヒドロン点滴静注ハック® 0.75mg 50m | 1 袋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 ★3.3mg 1mL | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロカリス点滴静注235mg10mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続)加算A | 00:10 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」100mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●アバスチン注 ☆100mg 4mL | 7.5 mg/kg | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:15 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:20 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 500mL(テルハック) | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●イリリチカン塩酸塩注 40mg 2mL | 150 mg/m ² | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管) | 00:25 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:30 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意コメント | day1(夕)~15(朝) S-1 80mg~120mg/日 day2-4デカドロン4mg朝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |