病名： 大腸癌　　レジメン名： 5-FU/LV＋アバスチン

1コース期間（休薬期間含む）　14　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day14												
			未適用	休薬												
注射																
グラニセトロン注 3mg100mL	1 V															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V															
中心静脈注射★	00:05		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V															
●アバスチン注 ☆100mg 4mL	5 mg/kg	100														
中心静脈注射★	00:10		未適用													
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V															
●レボホリナート注☆ 25mg	200 mg/m²	100														
中心静脈注射★	00:15		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
中心静脈注射★	00:25		未適用													
生理食塩液注 500mL（テルバック）	1 V															
ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V															
●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD（インフューザーポンプ使用	00:30		未適用													