

病名: 大腸癌

レジメン名: XELOX+アバスチン

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火 day1 未適用	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
注射																							
パロセトン点滴静注パック 0.75mg 50m	1 袋																						
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																						
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V																						
アバスチン注 ☆100mg 4mL	7.5 mg/kg	100																					
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用																				
ブドウ糖注 5%★500mL	1 V																						
オキサリプラチン注 ☆50mg	130 mg/m ²	100																					
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A																						
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用																				
処方																							

注意コメント
 day1(夕)-15(朝)セロ-タ[®]2000mg/m²/day 朝・夕
 day2-4デ[®]カ[®]ロ[®]ン8mg