

病名： 膀胱癌

レジメン名： オニバイド+5FU併用療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
			day1	day2~day14													
			未適用	休薬													
注射																	
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																
中心静脈注射★	00:10		未適用														
ブドウ糖注 5%★500mL	1 V																
●「必」オニバイド点滴静注43mg10mL	70 mg/m ²	100															
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用														
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																
中心静脈注射★	00:20		未適用														
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																
●レボホリナート注☆ 25mg	200 mg/m ²	100															
中心静脈注射★	00:25		未適用														
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																
中心静脈注射★	00:30		未適用														
生理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V																
ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V																
●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100															
中心静脈ケモ CSTD(インフューザーポンプ使用)	00:35		未適用														

注意コメント

day2-4デカドロン4mg