

病名：胆道癌

レジメン名：GCS療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1 未適用	day2~day14 休薬												
注射																
ハロセロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A															
アロカリス点滴静注285mg10mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルバッグ)	1 V															
●シスプラチン注 10mg 20mL	25 mg/m ²	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルバッグ)	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V															
●ゲムシタビン点滴静注 200mg	1000 mg/m ²	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:30		未適用													
処方																

注意コメント

day1(夕)~day8(朝) S-1 80mg~120mg/day