

病名： 食道癌

レジメン名： 毎週パクリタキセル療法

1コース期間(休薬期間含む) 49 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	
			火 day1 未適用	水	木	金 day2~day7 休薬	土	日	月	火 day8 未適用	水	木	金 day9~day14 休薬	土	日	月	火 day15 未適用	
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
ファモチジン注射液 20me	1 A																	
デキサート注射液5.5me 2mL	1 V																	
ポラミン注 5me 1mL	2 A																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用															
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																	
パクリタキセル注30me	100 me/m ²	100																
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10		未適用															
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V		未適用															
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用															
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
ファモチジン注射液 20me	1 A																	
デキサート注 ★3.3me 1mL	1 A																	
ポラミン注 5me 1mL	2 A																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:05									未適用								
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																	
パクリタキセル注30me	100 me/m ²	100																
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10									未適用								
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:15									未適用								
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
ファモチジン注射液 20me	1 A																	
デキサート注 ☆1.65me 0.5mL	1 A																	
ポラミン注 5me 1mL	2 A																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:05																	未適用
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																	
パクリタキセル注30me	100 me/m ²	100																
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10																	未適用
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:15																	未適用

1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
day22 未適用			day23~day28 休薬				day29 未適用			day30~day35 休薬				day36 未適用						day37~day49 休薬							