

病名:腎細胞癌

レジメン名:キイトルーダ(200mg/3週毎)+レンビマ療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

| 薬剤名/ルート・用法 | 基準投与量 | 割合 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
|----------------------|-------------|-----|-------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| | | | day1 未適用 | day2~day21 休薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:05 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」100mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●キイトルーダ点滴静注★100mg4mL | 200 mg/BODY | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:10 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:15 | | 未適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意コメント
レンビマ 20mg/body